

全民健康保險藥品使用標準碼

- 一、藥品使用標準碼定義（請參考全民健康保險醫事服務機構(門診、住院及交付機構)醫療費用點數申報格式及填表說明）：

藥品用量(長度 7，屬性 9)、藥品使用頻率(長度 18，屬性 X)、給藥途徑／作用部位(長度 4，屬性 X)。

二、編碼之原則：

1. 藥品用量：以全民健康保險藥品之核價單位【每錠、每支、每瓶、每包或每公克（毫克）、每毫升】為用量單位。填藥品一次之劑量右靠不足前補 0。
2. 藥品使用頻率：依一般使用頻率分為以下 4 部分（格式文字部分皆為英文大寫，請左靠不足補空白）

(1) 非每日常規使用頻率

QW(x,y,z……)：每星期 x，y，z……使用 (x、y、z=1,2,3……)

yW_zD ：每 y 星期使用 z 天 (y、z=1,2,3……)

MCD_xD_y ：月經第 x 天至第 y 天使用 (x、y=1,2,3……)

QOD：隔日使用 1 次

Q_xD ：每 x 日 1 次 (x=2,3,4,……)

Q_xW ：每 x 星期 1 次 (x=1,2,3,4,……)

Q_xM ：每 x 月 1 次 (x=1,2,3,4,……)

QW：每星期 1 次

BIW：每星期 2 次

TIW：每星期 3 次

STAT：立刻使用

ASORDER：依照醫師指示使用

(2) 每日常規使用頻率

Q_xH ：每 x 小時使用 1 次 ($x=1,2,3,4,\dots$)

Q_xMN ：每 x 分鐘使用 1 次 ($x=1,2,3,4,\dots$)

QD：每日 1 次

QDAM：每日 1 次上午使用

QDPM：每日 1 次下午使用

QDHS：每日 1 次睡前使用

QN：每晚使用 1 次

BID：每日 2 次

QAM&HS：上午使用 1 次且睡前 1 次

QPM&HS：下午使用 1 次且睡前 1 次

QAM&PM：每日上下午各使用 1 次

TID：每日三次

BID&HS：每日 2 次且睡前 1 次

QID：每日 4 次

HS：睡前 1 次

TID&HS：每日 3 次且睡前 1 次

(3) 服用時間

AC：飯前

AC_xH ：飯前 x 小時使用 ($x=1,2,3,4,\dots$)

AC_xM ：飯前 x 分鐘使用 ($x=1,2,3,4,\dots$)

PC：飯後

PC_xH ：飯後 x 小時使用 ($x=1,2,3,4,\dots$)

PC_xM：飯後 x 分鐘使用 (x=1,2,3,4,……)

(4) PRN 需要時使用

PRN：需要時使用

Q_xHPRN：需要時每 x 小時使用 1 次 (x=1,2,3,4,……)

3. 給藥途徑／作用部位：(格式皆為英文大寫，請左靠不足補空白)

AD：右耳

AS：左耳

AU：每耳

ET：氣切內

GAR：漱口用

HD：皮下灌注

ID：皮內注射

IA：動脈注射

IE：脊髓硬膜內注射

IM：肌肉注射

IV：靜脈注射

IP：腹腔注射

IPLE：胸膜內注射

ICV：腦室注射

IMP：植入

INHL：吸入

IS：滑膜內注射

IT：椎骨內注射

IVA：靜脈添加

IVD：靜脈點滴滴入

IVI：玻璃體內注射

IVP：靜脈注入

LA：局部麻醉

LI：局部注射

NA：鼻用

OD：右眼

ORO：口咽直接用藥(如噴劑、塗抹)

OS：左眼

OU：每眼

PO：口服

SC：皮下注射

SCI：結膜下注射

SKIN：皮膚用

SL：舌下

SPI：脊髓

RECT：肛門用

TOPI：局部塗擦

TPN：全靜脈營養劑

VAG：陰道用

IRRI：沖洗

EXT：外用

XX：其他

三、本規定之編碼不敷使用「藥品使用頻率」得暫以最接近編碼或

ASORDER 申報；「給藥途徑／作用部位」得暫以最接近編碼或 XX 申

報，惟以上 2 種情形應於費用申報後一個月內行文本局提供建議編

碼。