

115年8月學術演講會

主辦單位：社團法人臺中市大臺中醫師公會
協辦單位：童綜合醫療社團法人童綜合醫院
日期：115年08月02日（星期日）下午13時00分至16時30分
上課地點：童綜合醫院-20樓視聽教室
上課地址：台中市梧棲區台灣大道八段699號20樓

課程表

時間	題目	講師
12：40 至 13：00	報到	
13：00 至 13：05	主席致詞	林釗尚 理事長 陳振昆 理事 蔡青劭 教學副院長
13：05 至 13：30	成人健檢與老人健檢暨流感疫苗分享	博佑診所 蔡孟軒 院長
13：30 至 14：30	淋巴水腫外科治療	童綜合醫院(整形外科) 郭彥辰 醫師
14：30 至 15：30	生成式 AI 在糖尿病的臨床運用	童綜合醫院(內科部) 曾耀賢 部主任
15：30 至 16：30	感染症診斷及處置的常見迷失	童綜合醫院(感染科) 陳志銘 主任

- ※ 本次課程申請以下學分 ※
- (1)臺灣醫學會：專業課程 1.2 分，品質課程 2.4 分
 - (2)台灣家庭醫學會：乙類 1 點
 - (3)台灣內科醫學會：3 積分
 - (4)台灣外科醫學會：2 點
 - (5)台灣專科護理師學會(護理師、專科護理師)：審查中

- ◎護理人員參加者酌收費用 100 元(請於現場繳納)。
- ◎全程參與課程者，會後贈送精美餐點一盒。(中途離場，歉難發給)
- ◎請於 115 年 07 月 29 日中午前完成報名，俾備簽名單製作及確認餐盒數量。
- ◎當日本會不提供茶飲。請自備茶壺或水杯。
- ◎本場次無提供停車優免。

❖ 報名方式 ❖

- 一、網站：gtma.org.tw/學術演講/2026-08-02 項下
- 二、電話：04-25222411 楊小姐



● 〈淋巴水腫外科治療〉

郭彥辰 醫師

淋巴水腫是一個古老的疾病，在醫療衛生尚未普及時期，寄生蟲的感染是造成淋巴水腫最常見的原因。但隨著公共衛生政策的進步與醫療的快速發展，這個疾病現今依然困擾著人類們。當今患者發生淋巴水腫的原因 有很大一部分與各種癌症治療的併發症有關，也有許多是被發現跟本身基因的缺陷相關。過去大部分的患者甚至是醫療相關人員 對於淋巴水腫的治療，多半感到很陌生，藉由這次機會，跟大家分享淋巴水腫的病生理機轉、診斷方式、過去的治療方式，現在的治療趨勢以及未來的治療展望等。

● 〈生成式 AI 在糖尿病的臨床運用〉

曾耀賢 部主任

醫療 AI 的臨床落地，可從「資料整理、知識檢索、流程輔助」三個層面切入。初期不宜直接用於診斷或治療決策，而是先導入病歷摘要、檢驗趨勢整理、用藥變化比對、衛教草稿、會議紀錄與品質指標追蹤。技術上可透過提示詞模板，讓 AI 依固定格式輸出；進一步結合院內指引、常用衛教資料或臨床路徑，利用 RAG 檢索提供有來源依據的內容。實際導入時，需設計人工審核、個資去識別化、錯誤回報與版本控管機制。AI 的角色應是減少重複文書、加速資料搜尋與輔助臨床思考，最後判斷仍由醫師負責。

● 〈感染症診斷及處置的常見迷失〉

陳志銘 主任

抗生藥的不適當使用可能增加藥物副作用及抗藥性菌株感染風險，並增加醫療成本，這次演講將討論於基層醫療中常見感染症診斷及治療上的迷思。

1. 小腿紅腫多數是蜂窩組織炎引起
事實：文獻報告提到，臨床上診斷的蜂窩組織炎約有 40% 其他診斷，最常見被誤認為蜂窩組織炎的疾病是 stasis dermatitis。
2. 尿液培養出 $\geq 10^5/\text{mL}$ 細菌，病人有泌尿道感染，需要治療。
事實：無症狀 bacteriuria 及 pyuria 以不同比例出現在各族群，並非罕見。診斷臨床 UTI 主要依據有無上、下泌尿道感染之症狀，而非尿液外觀、WBC 數量及細菌培養結果。
3. 一個 beta-lactam 藥物過敏，對其他 beta-lactam 過敏機會很高。
事實：研究資料統計，病史上描述的 penicillin 過敏，90% 並沒有真正的過敏反應。而且 beta-lactam 交互過敏反應主要是看 R1 side chain 的相近程度。Penicillin 類藥物的 R1 side chain 跟 cefazolin 不同，cefazolin 的 R1 side chain 也跟 ceftriaxone 或 cefepime 不同，當然也跟 carbapenem 不同，因此 penicillin 過敏病人還是可以開立 cefazolin 或 ceftriaxone。
4. 對 GPC 格蘭氏陽性球菌感染，vancomycin 是治療效果最好的藥。
事實：對 oxacillin-susceptible *St. aureus*, vancomycin 的治療效果明顯不如 oxacillin 或 cefazolin。對 ampicillin-susceptible *Enterococcus* spp. 研究結果顯示根用 ampicillin 治療相比，vancomycin 的使用沒有好處。對 beta-lactam 敏感的 GPC，治療第一線藥物仍應以 beta-lactam 為主。